

SYNERGIE®

RAMBO

**MIEUX QU'UN RAY-GRASS
ITALIEN EN DÉROBÉE !**

COMPOSITION

40 % RAY-GRASS ITALIENS



20%

RAY-GRASS ITALIEN
ALTERNATIF 2N

IMPERIO



20%

RAY-GRASS ITALIEN
NON ALTERNATIF 2N

MAJESTY

100% DIPLOÏDE

100 % FLORAISONS TARDIVES

60% TRÈFLES ANNUELS D'HIVER



20%

TRÈFLE
SQUARROSUM
TARDIF

**TERRES
FRANCHES**



20%

TRÈFLE DE MICHELI
TARDIF

VIPER

TERRES HYDROMORPHES



20%

TRÈFLE DE PERSE*
TARDIF

*Floraisons tardives : MOA, VITTORIA, CIRO ou CELTICO

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

- L'implantation est très rapide.
- L'exploitation est possible début octobre avec un semis au 15 août ; la production sera de 4,0/4,5 t MS/ha.
- Le potentiel de productivité est de 6 à 8 t MS/ha pour l'exploitation d'avril.
- L'ensilage début avril permet un semis précoce du maïs.

GAINS ÉCONOMIQUES

par rapport au ray-grass italien en dérobée
RAMBO 14-16 % MAT vs RGI 10.5% MAT

- ➔ Production de protéines = réduction des achats soja
- ➔ Réduction de la fertilisation azotée : 30 à 50 unités suffisent en sortie d'hiver
- ➔ Restitution d'azote à la culture suivante

VALEUR ALIMENTAIRE

Comparatif valeurs alimentaires RAMBO vs RGI alternatif

	UFL	dMO	MAT
RGI ALTERNATIF (début d'épiaison)	0.87	73.0	10.5
RAMBO 14 % MAT	0.96	74.6	14.0
RAMBO 16 % MAT	0.96	74.6	16.0
	+0.09	+1.6	+3.5 à 5.5 points

Sources : RGI, table INRA 2018 / Analyses Semental 2020-2024

RAMBO DANS LA RATION



INRation[®] V5 | **RUMIN'AL[®]**



LA référence des logiciels de rationnement des **ruminants**.

Prend en compte, en sus, la quantité et qualité des fibres.

Données pour calcul des gains

Troupeau	
80 vaches laitières	
Soja	Lactation
3.5 kg/VL/j	340 jours
Lait	Niveau d'étable
450 €/1000 L	8 900 kg

INGESTION

	Ensilage maïs	Ensilage herbe	Total		
	11.5 kg MS	5.5 kg MS	17 kg MS		
				MAT ration (%)	Production laitière (kg)
1/3 TÉMOIN RGI 10.5% MAT	15.0	26.3	-		
1/3 RAMBO 14% MAT	15.7	26.6	+0.3		
1/3 RAMBO 16% MAT	16.2	26.8	+0.5		

Gain/
lactation

3 565 €

5 942 €

Source : logiciel RUMIN'AL

NOS CONSEILS DE CULTURE



1 PRÉPARATION DU SOL

- Labour impératif après céréales (sulfos)
- Préparation d'un lit de semences fin

2 DATE DE SEMIS

- **À partir du 15 août** et du retour des pluies
- **Jusqu'à fin octobre**

3 DOSE DE SEMIS

AOÛT/DÉBUT SEPTEMBRE

- 20-24 kg/ha

FIN SEPTEMBRE/DÉBUT OCTOBRE

- 22-26 kg/ha

4 SEMIS

- Retirer les descentes du semoir
- Semis à 1 cm de profondeur maxi
- Rouler après semis
- Un anti-limace est conseillé au semis pour sécuriser la présence des trèfles

5 FERTILISATION

- 40 unités de phosphore et 80 unités de potasse à l'implantation
- 40 à 50 unités d'azote en sortie d'hiver

6 DATES D'EXPLOITATION

AVANT L'HIVER

- Octobre ou novembre pour tous les semis avant le 15 septembre

Les trèfles doivent être au stade rosette à l'entrée de l'hiver

AU PRINTEMPS

- Stade de récolte optimal : début épiaison du RGI

7 TYPES D'EXPLOITATION

- Affouragement en vert
- Ensilage
- Enrubannage



Tél. : 02 43 76 22 94 - Fax : 02 43 76 59 55
semental@semental.fr - www.semental.fr



Retrouvez toutes nos variétés,
nos mélanges et nos associations

