

CHERRY
**MÉLANGE
SORGHOS ENSILAGE**
**MONOCOUBE
TARDIFS**

COMPOSITION

35% TEXAN

MÂLE STÉRILE
DEMI TARDIF

**35% SUGAR
GRAZE**

FÉCONDABLE
DEMI TARDIF

30% BIG DRAGON


PHOTO PERIOD SENSITIVE
TARDIF

POSITIONNEMENT



- Besoin 1300-1350°C en base 11°C à 28% de MS
- Cycle de 135-150 jours
- Récolte entre le 20/09 et le 10/10 au plus tard
- Objectif de récolte : 26 à 30% MS

PRODUCTIVITÉ



ZOOTECHNIE

COMPARATIF VALEUR ALIMENTAIRE/MAÏS

	SORGHO <i>BMR</i>	MAÏS	ÉCART
MS	24.4	32.5	-8.2 → Réhydrate la ration
UFL	1.03	0.94	+0.09 → Plus riche en ÉNERGIE
dMO	76.0	70.2	+5.8 → Une meilleure DIGESTIBILITÉ
Amidon	4.3	32.3	-28.0 → Un fourrage moins riche en amidon, sans affecter sa valeur énergétique
Sucre	20.4	6.0	+14.4 → Une source d'énergie différente
MAT	7.7	7.0	+0.7 → Plus riche en PROTÉINES
NDF	55.2	41.9	+13.3 → Beaucoup plus de FIBRES = stimule la rumination

Source : moyenne analyses Germ Services/2018-2023

CHERRY DANS LES RATIONS



VACHES LAITIÈRES

Troupeau	Soja	Ration témoin	Ingestion Kg MS/j	Kg lait/jour/VL	Écart	Gain
80 VL	5 kg/j/VL	100% MAÏS	17.3	28.7	-	-
Lactation	Lait	1/3 SORGHO	17.3	29.3	+0.6	7 130 €
340 jours	450 €/1000 L	1/2 SORGHO	17.2	29.6	+0.9	10 695 €

Source : logiciel RUMIN'AL

TAURILLONS

Troupeau	Soja	Ration témoin	Ingestion Kg MS/j	GMQ	Écart	Gain
150 taurillons	2 kg/j/taurillon	100% MAÏS	6.8	1 333	-	-
Durée d'engraissement	Viande	1/3 SORGHO	6.8	1 406	+73 g	8 199 €
240 jours	5.2 €/kg carcasse	1/2 SORGHO	6.7	1 442	+109 g	12 243 €

Source : logiciel RUMIN'AL

1 POSITIONNEMENT

EN CULTURE PRINCIPALE DE MAI À SEPTEMBRE/OCTOBRE

- Éviter les sols froids, argileux
- Préférer les parcelles avec une exposition Sud

2 PRÉPARATION DU SOL

DE NOVEMBRE À MARS

- Effectuez une analyse du sol pour définir la fertilisation à apporter
- Décompactez systématiquement
- Réalisez une fumure organique durant l'hiver : 30/50 t de fumier

DE MARS À AVRIL

- Réalisez un labour
- Travaillez le sol finement en surface
- Réalisez 1 à 2 faux-semis

3 LE SEMIS

MAI

Ne pas semer trop tôt

Conditions à respecter : le sol doit être à 12°C minimum

- Semez sur un sol rattaché pour sécuriser la levée
- Utilisez un semoir monograine : sécurise la régularité du semis sur le rang et en profondeur
- Profondeur de semis : 4 cm
- Vitesse de semis : 4 km/h maximum

À RÉALISER

- Apport d'un engrais starter
- Insecticide si pâture de longue durée
- Anti-limaces
- Passage de herse étrille après semis

DENSITÉ DE SEMIS

Écartement	Nombre de graines / ha
40 cm	220 - 240 000
75 cm	165 - 170 000

4 FERTILISATION MINÉRALE

POTENTIEL DE RENDEMENT (t MS / ha)	APPORT D'ENGRAIS MINÉRAL (Unités / ha) (SELON PRÉCÉDENT ET APPORT ORGANIQUE)		
	N	P	K
10 - 14	30 - 60	60	45
14 - 18	30 - 80	70	60
18 - 22	30 - 100	90	75

5 DÉSHÉRBAGE

- À l'implantation, post-semis/prélevée
- Au stade 3 feuilles
- En rattrapage

6 BINAGE

- **Au stade 3/4 feuilles** : permet de détruire les éventuelles repousses d'adventices
- **Au stade 6/10 feuilles** : permet de réchauffer et aérer le sol, dynamise le développement du sorgho

7 INSECTICIDE SELON PRÉSENCE DES PARASITES

- **Au stade 6/8 feuilles** : traitement sur noctuelles
- **Au stade 6/10 feuilles** : traitement sur pucerons, cicadelles, pyrales, sésamies, si les feuilles sont en cornet

8 OLIGOÉLÉMENTS

Apporter un biostimulant foliaire enrichi en Zn et Mg

9 IRRIGATION

Avant floraison, pas d'irrigation après le 10 août

- Pas plus de 25 mm par apport
- Les excès sont préjudiciables

10 RÉCOLTE

DU 20 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE

- Récoltez à 26/30 % de matière sèche
- Retirez l'éclateur de l'ensileuse
- Hachez à 3-5 cm
- Ne pas trop tasser au silo
- Préférez les récoltes l'après-midi, 72 h après la dernière pluie

