



BONFIRE

SEIGLE FOURRAGER

BONFIRE

| | |
|----------------------|---------------|
| ESPÈCE | SEIGLE |
| TYPE | FOURRAGER |
| ALTERNATIVITÉ | ALTERNATIF |

» MORPHOTYPE :

| | |
|--------------------------|-----------------|
| • Port : | Très érigé |
| • Feuillage : | Assez fin |
| • Couleur du feuillage : | Vert clair |
| • Hauteur de plante : | 1,80 / 2 mètres |

» PRÉCOCITÉ :

| | |
|----------------------------|-------------|
| • Date de début épiaison : | Début avril |
|----------------------------|-------------|

» PRODUCTIVITÉ († M.S./ha) :

8 / 12

» CARACTÉRISTIQUES QUALITATIVES :

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| • Départ en végétation : | Rapide |
| • Sensibilité au gel : | Très peu sensible |
| • Résistance aux maladies : | Excellente |
| • Résistance à la verse : | Bonne à très bonne |

» DESTINATION :

- Fourrage
- Méthanisation

» AIRE DE CULTURE :

Toute France

» PRÉCONISATIONS SEMIS (kilos / ha) :

| | |
|---|--|
| • En pur : | - Semis septembre : 85 / 90 - Semis octobre : 100 / 110 - Semis novembre : 110 / 115 |
| • En association : (pour développement des mycorhizes) | - Vesce velue : 30 % - Trèfle annuel : 10 % |
| • En mélange : (pour densifier) | - RGI 10 kg |