



# SIXTUS

## RADIS FOURRAGER

### NÉMATOCIDE CLASSE 2

FLORAISON TRÈS TARDIVE



<b>ESPÈCE</b>	<b>RADIS FOURRAGER</b>
<b>TYPE</b>	NÉMATOCIDE CLASSE 2
<b>PRÉCOCITÉ</b>	FLORAISON TRÈS TARDIVE

## » MORPHOTYPE :

• Port :	Évasé
• Hauteur de plante :	40/60 cm
• Feuillage :	Large
• Couleur du feuillage :	Vert foncé

## » PRÉCOCITÉ :

• Date de début de floraison :	Mars de l'année qui suit le semis
--------------------------------	-----------------------------------

## » PRODUCTIVITÉ (t M.S./ha) :

4,5 / 6,0

## » CARACTÉRISTIQUES QUALITATIVES :

• Départ en végétation :	Rapide
• Résistance aux maladies :	Excellente
• Nématicide :	Classe 2
• Contre les nématodes de la betterave :	- Heterodera schachtii - Ditylenchus dipsaci
• Résistance à la verse :	Excellente
• Sensibilité au gel :	Destruction à : - 10 / -13 °C

## » DESTINATION :

- Piégeage des nématodes de la betterave à sucre

## » AIRE DE CULTURE :

Zones de production de la betterave à sucre

## » PRÉCONISATIONS SEMIS (kilos / ha) :

• En pur :	7 / 12 kg / ha
• En association :	avec légumineuses : 4/5 kg
• En mélange :	avec moutarde : 30 % à 50 % SIXTUS avec phacélie : 5/6 kg