



NABUCCO

RAY-GRASS ITALIEN

NON ALTERNATIF

TÉTRAPLOÏDE



NABUCCO

ESPÈCE RAY-GRASS ITALIEN

TYPE NON ALTERNATIF

PLOÏDIE TÉTRAPLOÏDE



» MORPHOTYPE :

- Port : Semi-dressé
- Finesse du feuillage : Fin pour un tétraploïde ; Plus ou moins égal à un diploïde
- Couleur du feuillage : Vert foncé

» PRÉCOCITÉ :

- Date de départ en végétation : 16/03 (Hauteur 25 cm)
- Date de début d'épiaison : 08/05
- Souplesse d'exploitation : 55 jours

Source HERBE BOOK 2019

» PRODUCTIVITÉ (t M.S./ha) :

- Production de printemps : 12,0
- Production été / automne : 3,6
- Production annuelle moyenne : 14,1

Source HERBE BOOK 2019

» CARACTÉRISTIQUES QUALITATIVES :

- Alternativité : 2,2
- Remontaison : 5,9
- Résistance aux maladies
 - Rouille : 5,0
 - Helminthosporiose : 6,7
 - Xanthomonas : 7,1
- Résistance à la verse : 5,2

Source HERBE BOOK 2019

Notations de 1 à 9. 9: le caractère s'exprime fortement

» PÉRENNITÉ :

7,2

Source HERBE BOOK 2019

Notations de 1 à 9. 9: le caractère s'exprime fortement

» AIRE DE CULTURE :

Toute France

» DESTINATION :

Pâture / ensilage

» PRECONISATIONS SEMIS (kilos / ha) :

- En pur : 25/30 kg/ha
- En association : 10 kg/15 kg/ha trèfle violet