



VITERBO

TRÈFLE INCARNAT
FLORAISON TARDIVE

ESPÈCE
PRÉCOCITÉ

TRÈFLE INCARNAT
FLORAISON TARDIVE



» MORPHOTYPE :

- Port :
 - à l'implantation :
 - en végétation :
 - Feuille :
 - Couleur du feuillage :
- Étalé, puis forme une touffe semi-dressée
La tige « coude » par le poids des feuilles
Trifoliée. Chaque foliole ressemble à un cœur
Vert clair

» PRÉCOCITÉ :

- Date de début de floraison : 10/15 mai
- Ecart avec les précoces 22/24 jours plus tardif

» PRODUCTIVITÉ (t M.S./ha) :

- Au stade début bourgeonnement : 6/7

» CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES :

- Rythme de pousse :
 - A l'implantation :
 - En sortie d'hiver :
 - Aptitude à la repousse :
 - Tolérance au froid :
 - Agressivité :
- Reste en touffe
Départ en végétation assez lent
Une fois fleuri, pas de repousse
Excellente, mais au stade rosette
Faible à très faible

» VALEUR ALIMENTAIRE :

- Stade début bourgeonnement :
- U F L : 1
 - D M O : 78/80
 - M A T : 180/200

» AIRE DE CULTURE :

- Toute France
- Non adapté aux sols froids et hydromorphes

» DESTINATION :

- En pur : Pâture ou affouragement en vert : nécessité d'une transition
- Associé : Pâture et ensilage

» PRECONISATIONS SEMIS (kilos / ha) :

- En pur : PMG 3,2/3,5 g
20/25 kg/ha
- En association : 60% au minimum/15kg/ha