

SORGHO ENSILAGE



BIG KAHUNA

TARDIF - PHOTO PERIOD SENSITIVE



AGRONOMIE

VITESSE DE DÉMARRAGE



RUSTICITÉ




RÉSISTANCE VERSE



Notation basée sur les résultats des réseaux d'essais.


POSITIONNEMENT



SEMIS ENTRE 10/05 ET LE 05/06
À EVITER EN ZONE FROIDE

GABARIT

2,40 à 3m




Brown Mid Rib
Nervure brune
centrale

DOSE DE
300 000
GRAINES



Semental
INNOVATION & PERFORMANCE

PRODUCTIVITÉ




Source : essais Semental en culture sèche

**UN POTENTIEL À LA HAUTEUR
DE LA MATIÈRE SÈCHE RÉCOLTÉE**

VALEUR ALIMENTAIRE

● SORGHO  ● SORGHO non-BMR



Source : moyenne analyses Germ Services/2018-2025

**FOURRAGE TRÈS DIGESTIBLE
ET RICHE EN ÉNERGIE**

INTÉRÊTS ZOOTECHNIQUES

DES FIBRES EN QUANTITÉ

- Dynamisation de la rumination
- Amélioration de la qualité du lait
- Améliore l'état sanitaire du troupeau
- Diminution des cellules

ENERGIE PAR LES FIBRES ET LE SUCRE

- Aucun risque d'acidose
- Diminution des boiteries
- Meilleure détection des chaleurs

ALIMENT DE BASE RICHE
ET ÉQUILIBRÉ

- Fourrage riche en énergie et en azote (MAT : 7 à 9%)
- Ration de base sécurisée
- Valeur alimentaire stable quelque soit le climat

ITINÉRAIRE CULTURAL

- Semis du 10 au 30 mai en culture principale
- Semer sur un sol bien préparé, rouler avant semis
- Utiliser un semoir monograine

DENSITÉ DE SEMIS

Écartement	Nombre de graines / ha
40 cm	220 - 240 000
75 cm	165 - 170 000

- Semer à 4 cm de profondeur et à 4 km/h
- Fertilisation starter recommandée

POTENTIEL DE RENDEMENT (t MS / ha)	APPORT D'ENGRAIS MINÉRAL (Unités / ha) (SELON PRÉCÉDENT ET APPORT ORGANIQUE)		
	N	P	K
10 - 14	30 - 60	60	45
14 - 18	30 - 80	70	60
18 - 22	30 - 100	90	75

- Désherbage mécanique : le binage a un effet très positif sur le sorgho.
Désherbage chimique, se référer aux recommandations ARVALIS (Choisir et décider Sorgho)
- Récolte à 24/28% de matière sèche :
 - du 20 septembre au 10 octobre
 - Préférez les récoltes l'après-midi, 72h après la dernière pluie

